



ÉVEIL AUX ALLERGIES SÉVÈRES
Formulaire 230-57a


POUR USAGE DANS:

- Salle de classe
- Salle à manger
- Salle des enseignants.es
- Bureau
- Fanny pack

Nom

~ DESCRIPTION DE L'ALLERGIE

Cet(te) enfant souffre d'une allergie DANGEREUSE, constituant un danger de mort aux aliments suivants: _____
 _____ et
 à toute nourriture qui les contiennent en forme et en montant quelconque, incluant les items suivants: _____



~ ABSTINENCE

Afin d'éliminer la possibilité d'un cas d'urgence, il est nécessaire de **S'ABSTENIR TOTALEMENT** de ces aliments en tout temps. **SANS L'EPIPEN®/L'ANA-KIT®, CET(TE) ENFANT NE DOIT PAS ÊTRE PERMIS(E) DE MANGER QUOIQUE CE SOIT.**

~ RÈGLEMENTS CONCERNANT LA NOURRITURE (Veuillez énumérer, ci-dessous, les règlements concernant la nourriture qui s'applique à votre enfant, s'il y a lieu)

SYMPTÔMES POSSIBLES

- visage rouge, urticaire, enflure ou démangeaison des lèvres, de la langue ou des yeux
- oppression de la gorge, de la bouche ou de la poitrine
- difficulté à respirer ou à avaler, respiration sifflante, toux, étranglement
- vomissements, nausée, diarrhée, mal au ventre
- vertige, instabilité, fatigue soudaine, battement de coeur rapide
- perte de connaissance

PLAN D'ACTION - CAS D'URGENCE

- Administrez l'EpiPen®/l'Ana-Kit® immédiatement!
- FAITES APPELER L'AMBULANCE et avisez l'expéditeur qu'un(e) enfant souffre d'une réaction anaphylactique.
- Si on observe des difficultés de respiration (respiration sifflante, toux, éclaircissement de la gorge), administrez une deuxième EpiPen®, si disponible.
- Même si les symptômes sont complètement disparus, cet(te) enfant doit être transporté(e) à l'hôpital immédiatement.
- Les EPIPENS®/ANA-KIT® se trouvent: _____

 Médecin / Date

 Parent / tuteur / tutrice - Date

* Tiré du document *L'anaphylaxie: Guide à l'intention des commissions et conseils scolaires*